

Beschreibungshilfe

Allgemeine Informationen zur Sortenbeschreibung für die amtliche Anerkennung und Erfassung der Sorten in der Liste allgemein bekannter Obstsorten Österreichs

HASELNUSS *Corylus avellana* L. & *Corylus maxima* Mill.

Aufbruch der **Blattknospen** (wenn 2 Blätter aus den Knospen hervortreten)

O sehr früh 'San Giovanni'	O früh 'Tonda Gentile delle Langhe' 'Tonda di Giffoni'	O mittel 'Negret' 'Tonda Romana'	O spät 'Cosford' 'Merveille de Bollwiller'	O sehr spät
--------------------------------------	---	---	---	--------------------

Männliche Blütezeit

O sehr früh	O früh	O mittel 'Negret'	O spät 'Merveille de Bollwiller'	O sehr spät
--------------------	---------------	-----------------------------	--	--------------------

Weibliche Blütezeit

O sehr früh	O früh 'Tonda di Giffoni'	O mittel 'Fertile de Coutard' 'Tonda Gentile delle Langhe'	O spät 'Daviana' 'Du Chilly' 'Merveille de Bollwiller'	O sehr spät
--------------------	-------------------------------------	---	--	--------------------

Hüllblätter (Verhältnis zur Fruchtlänge)

O kürzer 'Tonda Bianca'	O gleich lang 'Cosford' 'Fertile de Coutard' 'Merveille de Bollwiller' 'Ennis'	O länger 'Du Chilly' 'Segorbe' 'Tombul' 'Tonda Gentile delle Langhe'
-----------------------------------	---	---

Hüllblätter - Einbuchtung

O schwach 'Du Chilly' 'Tombul'	O mittel 'Fertile de Coutard' 'Tonda Gentile delle Langhe'	O stark 'Gunslebert' 'Negret'
---	---	--

(nach IB DL 2008; Hazelnut)



Hüllblätter – Verzahnung der Hüllblätter ineinander

O schwach 'Du Chilly' 'Tombul' 'Segorbe'	O mittel 'Fertile de Coutard' 'Tonda Gentile delle Langhe'	O stark 'Gunslebert' 'Negret'
--	---	--

(nach IB DL 2008; Hazelnut)



Fruchtgröße

O sehr klein	O klein 'Tonda Gentile delle Langhe' 'Negret' 'Tombul'	O mittel 'Segorbe' 'Tonda di Giffoni'	O groß 'Fertile de Coutard' 'Merveille de Bollwiller'	O sehr groß 'Bergeri'
---------------------	--	--	--	---------------------------------

Fruchtform

O rund

'Tonda Gentile delle Langhe'
'Fertile de Coutard'



O konisch

'Merveille de Bollwiller'



O eiförmig

'Impériatrice Eugénie'
'Negret'



O kurz zylindrisch

'Cosford'



O lang zylindrisch

'Du Chilly'



(nach UPOV, 1979)

Fruchtreife

O sehr früh

'San Pere'

O früh

'Tonda Gentile delle Langhe'

O mittel

'Daviana'
'Morell'
'Tonda Romana'

O spät

'Negret'
'Merveille de Bollwiller'

O sehr spät

Kernanteil (Gewichtsanteil)

O sehr gering

'Merveille de Bollwiller'

O gering

'Fertile de Coutard'
'Segorbe'

O mittel

'Tonda Gentile delle Langhe'
'Negret'

O hoch

'Impériatrice Eugénie'
'Daviana'

O sehr hoch

'Cosford'
'Tombul'


Quitte *Cydonia* Mill. sensu stricto

Pflanze: Wuchsform

- O aufrecht
'Vranja'
- O halb-aufrecht
'Champion'
- O ausladend
'Bourgeault'


Blattspreite: Form

- O elliptisch
'Della Cina'
- O rund
'Konstantinopel'
- O eiförmig
'Fabre'
- O verkehrt-eiförmig
'Tavsambas'



Frucht: Form

- O elliptisch
- O rund
'Jurak'
- O quadratisch
'Aurii'
- O verkehrt
eiförmig
'Ispolinskaya'
- O birnenförmig
'Vranja'
- O anders (mit Taille,
unregelmäßig, ...)
'Della Cina'



Skizze

Frucht: Größe

- O gering
'Bourgeault'
- O mittel
'Champion'
- O groß und sehr groß
'Vranja', 'Mammut'

Erdbeere

Fragaria L.

Fragaria x ananassa Ananas-, Garten- oder Kultur-Erdbeere

An der Entstehung dieser Kulturart waren die großfrüchtige Chile-Erdbeere (*F. chiloënsis*) (westl. S-u.N-Amerika) und die Virginische- oder Scharlach-Erdbeere (*F. virginiana*) (N-Amerika) durch eine zufällige Kreuzung im frühen 18. Jahrhundert beteiligt und sind somit Vorfahren der mehr als tausend Kultursorten, die heute weltweit unterschieden werden. *F. ananassa* ist gekennzeichnet durch ihre hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Klimabedingungen und wird auf allen Kontinenten kultiviert und weitergezüchtet. Ein- und immertragende Kultursorten werden unter *F. ananassa* zusammengefasst.

Fragaria x vescana Hybrid aus Garten- und Wald-Erdbeere die zu starker Rankenbildung neigt.

Fragaria viridis Knack-Erdbeere, Hügel-Erdbeere; Im pannonischen Raum erfolgt auch die Nutzung als Wildobst.

Fragaria moschata Groß-Erdbeere, Zimt-Erdbeere; Früher als Kulturobstpflanze genutzt, heute ist sie nur noch als Wildobst aufzufinden.

Fragaria vesca Wald-Erdbeere verbreitetste Wildform, Vorkommen in allen gemäßigten und subtropischen Arealen der nördl. Halbkugel; Wildobst, Teepflanze

F. vesca var. (*f.*) *semperflorens* Monats-Erdbeere (*F. semperflorens*) rankenlos

Vorherrschend in der Produktion findet sich einerseits *F. x ananassa* als Stammform der großfrüchtigen Erdbeere in die fortwährend Wildformen eingekreuzt wurden, andererseits verschiedene Kulturformen der Monats-Erdbeere (*F. vesca* var. *semperflorens*).

Pflanze: Stellung des Blütenstandes im Verhältnis zum Laub

unterhalb
'Crusader'

gleich hoch
'Astino'

oberhalb
'Dir. Paul Wallbaum'

Pflanze: Wuchsform

aufrecht
'Darselect'

halb aufrecht
'Senga Sengana'

breitwüchsig
'Darsdor'



UPOV TG 022.2

Pflanze: Nebenblätter: Farbe

grünlich-weiß

weiß
'Gariguette'

rosa
'Frel'

rot
'Tarpan'

Frucht: Größe

sehr klein
'Astino'

klein
'Senga Precosa'

mittel
'Mara de Bois'


groß
'Darselect'

sehr groß
'Maxim'

Frucht: Form

- nierenförmig 'Favette'
- kegelförmig 'Gorella'
- herzförmig 'Dir. Waulbaum'
- eiförmig 'Florika'
- zylindrisch 'Chandler'
- rhomboid 'Gariguette'
- abgeplattet 'Favette'
- kugelförmig 'Madame Moutot'
- keilförmig 'Georg Soltwedel'

UPOV TG 022 2



Frucht: Farbe

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="radio"/> weißlich-gelb
'Weisse Ananas' | <input type="radio"/> hellorange
'Madame Moutot' | <input type="radio"/> orange
'Cambridge Favourite' | <input type="radio"/> orangerot
'Gorella' |
| <input type="radio"/> rot
'Elsanta' | <input type="radio"/> purpur
'Senga Sengana' | <input type="radio"/> dunkelpurpur
'Rubina' | |

Frucht : Reife

- sehr früh früh mittel spät sehr spät

Remontierneigung

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> nicht remontierend
'Gariguette' | <input type="radio"/> teilweise remontierend
'Sweet Charly' |
| <input type="radio"/> vollständig remontierend
'Mara de Bois' | <input type="radio"/> tagneutral
'Florika' |


Walnuss *Juglans regia* L.

Pflanze: Zeitpunkt des (Blatt-)Knospenaufbruchs

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|---------------------|
| <input type="radio"/> sehr früh | 'Serr' | <input type="radio"/> sehr früh bis früh | 'Ashley' |
| <input type="radio"/> früh | 'Sorrento' | <input type="radio"/> früh bis mittel | 'Hartley' |
| <input type="radio"/> mittel | 'Chandler' | <input type="radio"/> mittel bis spät | 'Mayette' |
| <input type="radio"/> spät | 'Franquette' | <input type="radio"/> spät bis sehr spät | 'Ronde de Montgnac' |
| <input type="radio"/> sehr spät | | | |

Pflanze: Lokalisierung des weibl. Blütenstands bzw. Fruchtstands

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="radio"/> an der Spitze
der einjährigen
Zweige,
Fruchtbildung
an der
Außenseite des
Baumes) | <input type="radio"/> an der Spitze
langer Triebe an
zweijährigen oder
älteren Zweige
(Fruchtbildung in
Gruppen) | <input type="radio"/> auf die ganze
Länge
einjähriger
Zweige verteilt
(Fruchtbildung
an kleinen
Seitenzweigen) |
| 'Franquette' | 'Hartley' | 'Serr' |



UPOV TG 125 6

Nuß: Haftung der zwei Schalenhälften aneinander

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> sehr gering | <input type="radio"/> mittel | <input type="radio"/> stark |
| 'Pedro' | 'Mayette' | 'Franquette' |
| <input type="radio"/> gering | | <input type="radio"/> sehr stark |
| 'Marbot' | | 'Corne' |

UPOV TG 125 6


Nuß: Zeitpunkt der Reife

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <input type="radio"/> früh | <input type="radio"/> mittel | <input type="radio"/> spät |
| 'Serr' | 'Mayette' | 'Candelou' |
| <input type="radio"/> früh - mittel | <input type="radio"/> mittel - spät | |
| 'Pedro' | 'Franquette' | |

Erntereife (Datum): _____

Frucht: Form

- rund 'Meylannaise'
- dreieckig 'Hartley'
- breit eiförmig 'Marbot', 'Serr'
- eiförmig 'Gustine'
- kurz trapezförmig
- lang trapezförmig
- breit elliptisch 'Parisiene'
- elliptisch 'Franquette'
- herzförmig



1 Round



2 Triangular



3 Broad ovate



4 Ovate



5 Short trapezoid



6 Long trapezoid



7 Broad elliptic



8 Elliptic



9 Cordate

Fig. 6 Nut shape


Apfel & Apfel-Unterlagen *Malus* Mill.

Pflanze: Wuchsstärke (Unterlagen im Anzuchtbeet)

- sehr gering 'Discovery' M27
 gering 'Schöner aus Bath', Lobo
 mittel 'Cox Orange', 'Golden Delicious' M26
 stark 'Schöner von Boskoop'
 sehr stark 'Mutsu (Crispin)', 'Northern Spy' MM106

Frucht: allgemeine Form

- kugelförmig 'Resi'
 kugelig-kegelförmig
 Kurzkugelig-kegelförmig 'Idared'
 flach 'Discovery'
 flachkugelig
 kegelförmig 'Jonagold'
 lang kegelförmig
 stumpf kegelförmig
 ellipsoid 'Spencer'
 eiförmig 'Summerred'
 rechteckig, zylindrisch 'Grafensteiner'
 rechteckig kegelförmig
 rechteckig tailliert 'Starkrimson'



IB DL Malus

Frucht:

- | Grundfarbe | Deckfarbe | Ausprägung |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="radio"/> rot | <input type="radio"/> orange | <input type="radio"/> gestreift |
| <input type="radio"/> orange | <input type="radio"/> rosa | <input type="radio"/> adrig |
| <input type="radio"/> cremeweiß | <input type="radio"/> rot | <input type="radio"/> geflammt |
| <input type="radio"/> gelb | <input type="radio"/> dunkelrot | <input type="radio"/> gepunktet |
| <input type="radio"/> grüngelb | <input type="radio"/> purpur | <input type="radio"/> verwaschen |
| <input type="radio"/> grün | <input type="radio"/> braun | <input type="radio"/> verblichen |
| | | <input type="radio"/> vollständig gefärbt |
| | <input type="radio"/> berostet | <input type="radio"/> teilweise |
| | | <input type="radio"/> vollständig |

Blühbeginn (10% geöffnete Blüten)

- O sehr früh 'Anna'
- O früh 'Idared', 'Schöner von Boskoop'
- O mittel 'Cox Orange', 'Jonagold'
- O spät 'Court Pendu Plat', 'Rall's Janet'
- O sehr spät 'Spätblühender Taffetapfel'

Erntereife

- O sehr früh 'Vista Bella'
- O früh 'Discovery', 'Jerseymac'
- O mittel 'Cox Orange', 'Elstar', 'Gala'
- O spät 'Jonagold'
- O sehr spät 'Granny Smith', 'Fuji'

Unterlage: Anzahl an Trieben

- O sehr wenige M27
- O wenige M9
- O mittel M26
- O viele MM106, MM111
- O sehr viele M25

Marille *Prunus armeniaca* L.

Blühbeginn (erste vollständig geöffnete Blüten)

sehr früh

'Harmat'

früh

'Harcot'

mittel

'Ungarische Beste'

spät

'Bergeron'

sehr spät

'Harogem'

Blühbeginn (Datum): _____

Frucht: Größe, Gewicht

extrem klein

< 20 g

klein

20 – 40 g

mittel

'Harogem'

41 – 55 g

groß

'Goldrich'

56 – 70 g

extrem groß

'Hargrand'

> 71 g

25 Früchte (in Gramm, mit Stein): _____ g

Frucht: Form

(1) kugelig

'Cafona'

(2) abgeflacht

'Hargrand'

(3) oval

'Prevete'

(4) eiförmig


'Harlayne'

(5) herzförmig

'Luizet'

(6) rechteckig

'Veecot'



IB DL : Apricot Descriptors rev.

Frucht: Tiefe der Stielhöhle

flach

'Harlayne'

mittel

'Ungarische Beste'

tief

'Hatif Colomer'

Frucht: Zeitpunkt (des Beginns) der Reife

sehr früh

'Ninfa'

früh

'Orangered'

mittel

'Bergeron'

spät

'Larquen'

sehr spät

'Lartago'

Frucht:

- | Grundfarbe | Deckfarbe | Fruchtfleisch |
|---|---------------------------------|--|
| <input type="radio"/> nicht sichtbar | <input type="radio"/> orangerot | <input type="radio"/> weiß-grün
'Amban' |
| <input type="radio"/> weiß
'San Nicola' | <input type="radio"/> rot | <input type="radio"/> weiß
'Spitak' |
| <input type="radio"/> gelblich
'Vitulo' | <input type="radio"/> rosa | <input type="radio"/> creme
'Temprano' |
| <input type="radio"/> gelbgrün
'Grüne Spätmarille' | <input type="radio"/> purpur | <input type="radio"/> gelb |
| <input type="radio"/> hellorange
'Goldcot' | | <input type="radio"/> hellorange
'Harmat' |
| <input type="radio"/> orange
'Luizet', 'Veecot' | | <input type="radio"/> dunkelorange
'Harcot' |
| <input type="radio"/> dunkelorange
'Harcot', 'Harogem' | | <input type="radio"/> rot |

Süßkirsche *Prunus avium* L.

Blüte (50%)

- sehr früh 'Müncheberger Frühernte'
- früh 'Lapins', 'Sumtare'
- mittel 'Sumele', 'Napoléon', 'Burlat'
- spät 'Germersdorfer', 'Sam'
- sehr spät 'Regina'

Fruchtreife

- sehr früh 'Müncheberger Frühernte'
- früh 'Burlat'
- mittel 'Sunburst',
'Prinzessinenkirsche'
- spät 'Hedelfinger Riesenkirsche'
- sehr spät 'Regina'

Frucht: Farbe

- gelb 'Dönnissens Gelbe'
- orangerot 'Tardif de Vignola'
- zinnoberrot auf gelb 'Napoléon'
- zinnoberrot 'Sunburst'
- dunkelrot 'Hedelfinger Riesenkirsche'
- braunrot 'Burlat', 'Kordia'
- schwarz 'Schwarze Tartarische'

Frucht: Größe

- sehr klein 'Müncheberger Frühernte'
- klein 'Annonay', 'Früheste der Mark'
- mittel 'Early Rivers', 'Hedelfinger'
- groß 'Burlat', 'Van'
- sehr groß 'Duroni 3', 'Schneiders Sp.
Knorpelkirsche'

Sauerkirsche, Weichsel *Prunus cerasus* L.

Blüte (50%)

<input type="checkbox"/> sehr früh	'Érdi Bötermö'
<input type="checkbox"/> früh	'Favorit'
<input type="checkbox"/> mittel	'Vowi'
<input type="checkbox"/> spät	'Gerema', 'Kelleriis 16'
<input type="checkbox"/> sehr spät	'Schattenmorelle'

Fruchtreife

<input type="checkbox"/> sehr früh	'Tarina'
<input type="checkbox"/> früh	'Meteor Korai', 'Ludwigs Frühe'
<input type="checkbox"/> mittel	'Érdi Bötermö', 'Montmorency'
<input type="checkbox"/> spät	'Schattenmorelle'
<input type="checkbox"/> sehr spät	'Gerema', 'Vowi', 'Marasca'

Frucht: Farbe

<input type="checkbox"/> orangerot	'Meteor'
<input type="checkbox"/> hellrot	'Montmorency'
<input type="checkbox"/> rot	'Pándy Bb. 119'
<input type="checkbox"/> dunkelrot	'Gerema'
<input type="checkbox"/> braunrot	'Karneol', 'Schattenmorelle'
<input type="checkbox"/> schwarz	'North Star'

Frucht: Größe

<input type="checkbox"/> sehr klein	'Stevnsbaer'
<input type="checkbox"/> klein	'Cigánymeggy 7'
<input type="checkbox"/> mittel	'Schattenmorelle'
<input type="checkbox"/> groß	'Karneol'
<input type="checkbox"/> sehr groß	'Safir'

Zwetschke *Prunus domestica* L.

Frucht: Größe

- | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-----------|
| <input type="radio"/> | sehr klein | 'Mirabelle de Nancy' | < 35 g |
| <input type="radio"/> | klein | 'Hauszwetschke' | 36 – 55 g |
| <input type="radio"/> | mittel | 'Hanita', 'Stanley', 'Bluefre' | 56 – 70 g |
| <input type="radio"/> | groß | 'Nordens' | 71 – 85 g |
| <input type="radio"/> | sehr groß | 'Giant', 'Calita' | > 86 g |

25 Früchte (in Gramm, mit Stein): _____g

Frucht: Grundfarbe (ohne Bereifung, zur physiologischen Reife)

- | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> | grünweiß | 'Reine Claude diaphane' |
| <input type="radio"/> | grün | 'Große Grüne Reineclaude' |
| <input type="radio"/> | gelbgrün | 'Reine Claude d'Oullins' |
| <input type="radio"/> | gelb | 'Shiro' |
| <input type="radio"/> | orange | 'Emma Leppermann' |
| <input type="radio"/> | rot | 'Victoria' |
| <input type="radio"/> | hellviolett | 'Opal' |
| <input type="radio"/> | violett-blau | 'Anna Späth', 'Valor' |
| <input type="radio"/> | dunkelblau-schwarz | 'Cacaks Schöne' |

Frucht: Fruchtfleischfarbe (zur physiologischen Reife)

- | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|
| <input type="radio"/> | weiß | <input type="radio"/> | grün | <input type="radio"/> | gelb-grün | <input type="radio"/> | gelb | <input type="radio"/> | orange | <input type="radio"/> | rot |
| | | | 'Große Grüne Reineclaude' | | 'Ruth Gerstetter' | | 'Graf Bühl' | | 'Hanita' | | 'Bountiful' |

Stein: Haften am Fruchtfleisch

- | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | nicht anhaftend | <input type="radio"/> | zum Teil haftend | <input type="radio"/> | haftend |
| | 'Hauszwetschke' | | 'Elena' | | 'Ersinger Frühzwetschke' |
| | 'President' | | 'Bluefre' | | |

Stein: Größe im Vergleich zur Frucht


- | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|------|
| <input type="radio"/> | klein | <input type="radio"/> | mittel | <input type="radio"/> | groß |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|------|

Frucht : Reife (Beginn)

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| <input type="radio"/> | sehr früh | <input type="radio"/> | früh | <input type="radio"/> | mittel | <input type="radio"/> | spät | <input type="radio"/> | sehr spät |
| | 'Ruth Gerstetter' | | 'Ersinger Frühzwetschke' | | 'Graf Bühl' | | 'Cacaks Fruchtbare' | | 'President' |
| | | | | | | | | | 'Elena' |

Frucht: Form


- länglich
'Grand Prize'
- elliptisch
'Empress'
- kreisförmig
'Mirabelle de Nancy'
- breitrund
'Althanova'
- eiförmig
'Hanita', 'Stanley', 'Valjevka'
- verkehrt eiförmig
'President', 'Elena'




1
länglich




2
elliptisch




3
kreisförmig



4
breitrund



5
eiförmig



6
verkehrt eiförmig

Mandel *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb (*Prunus amygdalus* Batsch)

Blühbeginn

O sehr früh

'Cavaliera'

O spät

'Texas'

O früh

'Ne Plus Ultra'

O sehr spät

'Tardy Nonpareil'

O mittel

'Fournat de Brézenaud'

Blühbeginn (Datum): _____

Blüte: Farbe der Kronblätter

O weiss

'Bartre'

O rosaweiss

'Ai'

O rosa

'Marcona'

O dunkelrosa

'Trell'

Fruchtreife

O sehr früh

'Cavaliera'

O spät

'Marcona'

O früh

'Nonpareil'

O sehr spät

'Texas'


O mittel

'Ferragnès'

Ernte (Datum): _____

Trockene Frucht: Form

Dry fruit: shape
Fruit sec: forme
Trockene Frucht: Form



type 1
Typ 1

O Typ 1



type 2
Typ 2

O Typ 2



type 3
Typ 3

O Typ 3



type 4
Typ 4

O Typ 4

Kern: Form

UPOV TG 56 3

Kernel: shape
Amandon: forme
Kern: Form



O schmal
elliptisch



O elliptisch



O breit elliptisch



O sehr breit
elliptisch

Pfirsich Nektarine *Prunus persica* (L.) Batsch

Baum: Typ

- normal
 spur

Wahrer Fruchttrieb:

Anthocyanfärbung

- fehlend
 vorhanden
'Springtime'

Blüte: Blühbeginn

- sehr früh 'Sunred' früh 'Flavorcrest' mittel 'Redhaven' spät 'Nectared 6' sehr spät 'Buttercup'

Blüte: Form

- Rosaceae
'Robin'
 Campanulaceae
'Springtime'

Blütenblatt: Form

- schmal elliptisch

 breit elliptisch
'Earlibelle'
 rund
'Springtime'

Blattstiel: Nektarien

- fehlend
'Tejon'
 vorhanden
'Redhaven'

Blattstiel: Form der Nektarien

- rund
'Springtime'
 nierenförmig
'Redhaven'

Frucht: Behaarung

- fehlend
Nektarine (var. *nucipersica*)
 vorhanden
Pfirsich (var. *persica*)

Fruchtfleisch: Grundfarbe

- weiß
'Springtime' grün-weiß
'Charles Roux'
 hellgelb-gelb
'Armking' orange
'Sungold'
 rot
'Sanguine Vineuse'

Stein: Haften am Fruchtfleisch

- nicht anhaftend
'Mme. Girard' schwach
'Redhaven' mittel
'Early Sungold'
 stark
'Babygold 5' sehr stark
'Vivian'

Frucht : Genussreife

- sehr früh 'Springtime' früh 'Robin' mittel 'Fairhaven' spät 'Veteran' sehr spät 'Rubidoux'

(Most-) Birne *Pyrus* L.

Blühbeginn

- sehr früh 'Alexander Lucas'
- früh 'Louise Bonne d'Avranches'
- mittel 'Williams Christ'
- spät 'Doyenne du Comice'
- sehr spät 'Frangipane'


Genussreife

- sehr früh 'Doyenne de Juillet'
- früh 'Précoce de Trevoux',
- mittel 'Coscia'
- spät 'Doyenne du Comice'
- sehr spät 'Nordhäuser Winterforelle'

Frucht: Größe

- sehr klein 'Petit Muscat'
- klein 'Doyenne de Juillet'
- mittel 'Dr. Jules Guyot'
- groß 'Doyenne du Comice'
- sehr groß 'Margarete Marillat'

Frucht: Seitenform



Frucht : Verhältnis Länge zum größten Durchmesser

- sehr klein 'Passe Crassane'
- klein 'Arenbergbirne'
- mittel 'Williams Christ'
- groß 'Conference'
- sehr groß 'Abbé Fétel'

Frucht : Verhältnis Länge zum größten Durchmesser

- nicht sichtbar 'Uta'
- grün 'Neue Poiteau'
- gelbgrün 'Gellerts Butterbirne'
- gelb 'Williams Christ'

Frucht : Verhältnis Länge zum größten Durchmesser

- kurz 'Anjou'
- mittel 'Gellerts Butterbirne'
- lang 'Bosc's Flaschenbirne'

Stachelbeere

Ribes uva crispa L.

Fruchtreife

O sehr früh
'Risulfa'

O früh
'Mauks
Frühe Rote'

O mittel
'Rote Frankfurter'

O spät
'Rote Orléans'


O sehr spät
'Green Gem'

Frucht: Form

Fruit: shape

Fruit: forme

Frucht: Form




1

O kugelförmig
'Bila'



2

O ellipsoid
'Weiße Volltragende'



3

O birnenförmig
'Grüne Flaschenbeere'

Frucht: Größe

O sehr klein
'Amerikanische
Gebirgstachelbeere'

O klein
'Earky
Green'

O mittel
'Gelbe Triumph'

O groß
'Grüne Kugel'

O sehr groß
'Catherina'

Frucht: Farbe

O gelb
'Golden Lion'

O gelb-grün
'Gelbe Triumph'

O grün mit weiß
'Weiße Neckartaler'

O grün
'Grüne Kugel'

O rot
'Maiherzog'


Pflanze: Wuchsform



1

obovoid

O aufrecht
'Magnus'



2

globose

O halb-aufrecht
'Baldwin'



3

transverse ellipsoid

O breitwüchsig
'Tenah'

Rote und Weiße Ribisel

Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W.D.J. Koch, *Ribes niveum* Lindl.

Fruchtreife

O sehr früh 'Jonkher van Tets'
O früh 'Heros'
O mittel 'Mulka'
O spät 'Rote Holländische'
O sehr spät 'Heinemanns Rote Spätlese'

Fruchtbündel: Länge einschließlich Stiel

O sehr kurz
O kurz 'Weiße aus Jüteborg'
O mittel 'Rondon'
O lang 'Heros'
O sehr lang 'Traubenwunder'

Frucht: Größe

O sehr klein 'Mulka'
O klein 'Houghton Castle'
O mittel 'Laxtons Nr. 1'
O groß 'Heros'
O sehr groß 'Cascade'

Frucht: Farbe

O weiß 'Weiße versailer'
O weiß-gelb 'Witte Parel'
O rosa 'Rosa Sport'
O rot 'Victoria'
O dunkel rot 'Loppersummer'

Brombeere & Hybriden

(Loganbeere, Boysenbeere, ...)

Rubus subgenus eubactus sect. Moriferi und Ursini

Beschreibung der Sorte (Mutante/Typus) oder Unterlage

Winterrute: Dornen

O fehlend
'Loch Ness'

O vorhanden
'Himalaya'

Frucht: Breite

O schmal
'Tayberry'

O mittel
'Loch Ness'

O breit

O sehr breit
'Douglas'

Frucht: Länge

O kurz
'Himalaya'

O mittel
'Taylor's Prolific'

O lang

O sehr lang
'Tayberry'

Frucht: Farbe

O rot
'Sunberry'

O rötlich
purpur
'Tayberry'

O rötlich
schwarz
'Alfred'

O bläulich
schwarz
'Himalaya'

O schwarz
'Black Satin'

Pflanze: Wuchsform

O aufrecht
'Wilson's Early'

O aufrecht bis
halbaufrecht
'Kiowa'

O halbaufrecht
'Jersey Black'



1
aufrecht



2
aufrecht bis halbaufrecht



3
halbaufrecht



4
halbaufrecht bis breitwüchsig



5
breitwüchsig

O halbaufrecht
bis breitwüchsig
'Tayberry'

O breitwüchsig,
kriechend
'Himalaya'

UPOV TG 73 7

Himbeere *Rubus idäus* L.

Haupternte:

nur an der
Vorjahresrute im Sommer

sowohl an der
Vorjahresrute im Sommer
als auch an der Jahresrute
im Herbst

nur an der Jahresrute im
Herbst

'Malling Promise'

'Isabel'

'Autumn Bliss'

Pflanze: Anzahl Jungtriebe

gering

mittel

groß

sehr groß

'Rubaca'

'Glen Ample'

'Skeena'

'Summer'

Winterrute: Farbe

(nur Sorten, die ihre Haupternte an der Vorjahresrute im Sommer erbringen)

bräunlichgrau

graubraun

braun

'Schönemann'

'Malling Orion'

'Caliber'

purpurbraun

bräunlichpurpur

'Malling Landmark'

'Titan'

Fruchtreife an der Vorjahresrute

sehr früh

früh

mittel

spät

sehr spät

'Vene'

'Glen Clova'

'Willamette'

'Schönemann'

'Malling Leo'

Fruchtreife an der Jahresrute

sehr früh

früh

mittel

spät

sehr spät

'Ariadne'

'Polana'

'Watson'

'Korbfüller'

'Baronne de Wavre'

Frucht: Breite

schmal

mittel

breit

'Haida'

'Meeker'

'Glen Ample'

Frucht: Länge

kurz

mittel

lang

'Ontaria'

'Rafzmach'

'Malling Delight'

Frucht: Verhältnis Länge/Breite

klein

mittel

groß

'Caliber'

'Glen Clova'

'Tulameen'